



## Informe clínico para la Prescripción y Visado de EDOXABAN (Lixiana 60 mg y 30 mg)

### Filiación del paciente

Nombre y apellidos	
N.º Afiliación SS	
Fecha nacimiento (*edad)	_____ (____)

Tratamiento indicado <sup>1</sup>  Edoxaban 60 mg 1comp/24 horas durante \_\_\_\_\_  Edoxaban 30 mg 1comp/24 horas durante \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicar principio activo / dosis/ frecuencia dosis.

<sup>2</sup> **Contraindicado** con anticoagulantes. Pacientes con prótesis valvulares cardíacas.

<sup>3</sup> Medicamentos que pueden interactuar con edoxaban:

Los medicamentos o las enfermedades que aumenten el vaciado gástrico y la motilidad intestinal puede que reduzcan la absorción de edoxaban.

Los medicamentos que afectan a la homeostasia: antiplaquetarios, AINES, AAS a dosis altas,...pueden aumentar el riesgo de sangrado

Los inhibidores de la glicoproteína-P (P-gp): ciclosporina, dronedarona, eritromicina y ketoconazol, requieren ajuste de dosis de edoxaban.

Los inductores P-gp: rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o hierba de San Juan,..... pueden causar disminución de edoxaban.

Tratamiento previo con AVK (especificar medicamento, posología y duración del tratamiento)

Fecha analítica: _____	*Peso: _____ Kg ( $\leq 60$ kg, ajuste de dosis)
Creatinina sérica: _____ mg/dl	No recomendado $< 15$ ml/min.
Aclaramiento de Creatinina: _____ ml/min	16-50 ml/min (insuficiencia renal moderada o grave) ajuste de dosis
Niveles GOT :	No se recomienda en insuficiencia hepática grave. Contraindicado en pacientes con hepatopatía asociada a coagulopatía con riesgo de hemorragia clínicamente relevante.
Niveles GPT :	Emplear con precaución enzimas hepáticas elevadas (GOT/GPT $> 2 \times$ LSN) Emplear con precaución Bilirrubina total $\geq 1.5 \times$ LSN.

**La función renal se evaluará:** Siempre antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento mínimo una vez al año y en aquellas situaciones clínicas cuando se sospeche que la función renal podría estar disminuida o deteriorada.

**La función hepática** se evaluará antes de iniciar tratamiento y periódicamente en los pacientes tratados con edoxaban durante más de un año.

### Indicación para EDOXABAN (Lixiana 60 mg y 30 mg)

Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular, con 1 más de los siguientes factores de riesgo:

- Ictus, ataque isquémico transitorio previo.
- Insuficiencia cardíaca congestiva).
- Edad  $\geq 75$  años.
- Diabetes mellitus.
- Hipertensión.

**INDICACIÓN NO FINANCIADA POR EL SNS PARA EDOXABAN:** Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de EP en adultos.

### Criterios de inclusión (marcar al menos 1 )

- Hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso acenocumarol o warfarina.
- Antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en los que los beneficios de la anticoagulación superen al riesgo hemorrágico.
- Ictus isquémico con criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC.
- Tratamiento con AVK y episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR
- Tratamiento con AVK e imposibilidad de control de INR dentro de rango (2-3) ( $< 65\%$  de controles en rango durante 6 meses)
- Imposibilidad de acceso al control de INR convencional. Motivo \_\_\_\_\_  
(Imposibilidad de un seguimiento convencional de INR en los centros sanitario, o no disponer de enfermería de enlace o cuidados de hospitalización domiciliaria.)



**Región de Murcia**  
Consejería de Sanidad

Dirección General de Planificación, Investigación,  
Farmacia y Atención al Ciudadano



### SITUACIONES QUE REQUIEREN AJUSTE DE DOSIS (Ajuste de dosis 30 mg/24 h)

- Pacientes insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina de 15-50 ml/min)
- Pacientes con peso corporal  $\leq 60$  kg
- Pacientes con uso concomitante de los siguientes inhibidores de la proteina P (P-gp): ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol

### SELLO CON CIAS



..... de ..... de 201.....

**Firma del facultativo.**