

# Píldora inFormativa BIFAP

## Validación del diagnóstico de cáncer colorectal en AP

El estudio\* realizado con BIFAP ha permitido:

- Crear un algoritmo de identificación de casos de cáncer colorectal con un valor predictivo positivo del 87,3%
- Estimar la incidencia de cáncer colorectal en BIFAP, con valores comparables a los del Registro Nacional de Cáncer



*Todo ello gracias a:*

*El registro por el médico de AP en la HCE de 17.008 casos potenciales de cáncer colorectal*

*El registro normalizado en la HCE del episodio diagnóstico, junto con anotaciones confirmatorias en el texto libre*

# Píldora inFormativa BIFAP

## Sin embargo...la fecha de registro del diagnóstico



- Solo se confirmó en el 64,1% de los casos revisados manualmente
- En el 28,6%, la fecha correcta del diagnóstico estaba en una ventana de 180 días antes de la fecha registrada
- Y en el 7,2% de los casos la fecha correcta del diagnóstico fue incluso anterior a la ventana de 180 días

***Recordad la importancia de:***

*Fechar los registros en la HCE con la máxima precisión posible*

*Datar el episodio, no en la fecha de la consulta, sino en el comienzo de los síntomas, del diagnóstico o de las pruebas diagnósticas que lo documentan*

*Registrar correctamente las fechas de intervenciones quirúrgicas, episodios de urgencias e informes clínicos referidos por el paciente*

*Asignar las fechas correctas a los antecedentes clínicos del paciente*